


CERVICAL CANCER: VACCINATION + SCREENING SAVE YOUR LIFE



Prevention with screening tests:

Screening can detect pre-cancerous changes and find cancer at an early stage improving chances of cure.

Women < 30 years old:

- Pap smear test: starting at age 21, every 3 yrs



Women between 30 – 65 years old:

- -Pap smear test every 3 yrs
 - HPV test every 5 yrs
- OR
- HPV and Pap smear Co-test: every 5yrs



Women >65 years old:

- Screening continues for women with a history of precancerous cervical changes




Prevention with HPV vaccination:

Human papillomavirus (HPV) vaccination protects against high risk HPV strains that cause most cervical cancers:



- HPV vaccination is recommended for girls and boys between ages 11- 26 years old.
- It could be started as early as 9 years and considered until age 45.



سرطان عنق الرحم: اللقاح + الكشف المبكر ينقذان حياتك

الوقاية من خلال الكشف المبكر:

فحوصات الكشف المبكر يمكن أن تكشف عن تغيرات سابقة للسرطان وتجد السرطان في مرحلة مبكرة تحسّن فرص الشفاء

النساء تحت عمر > 30 سنة:



- مسحة عنق الرحم: ابتداءً من عمر 21 سنة، كل 3 سنوات

النساء من عمر 30 إلى 65 سنة:



- مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات
- فحص تقصي فيروس الورم الحليمي البشري كل 5 سنوات
- أو
- الفحص المشترك مسحة عنق الرحم و تقصي فيروس الورم الحليمي كل 5 سنوات

النساء فوق عمر < 65 سنة:



- مواصلة الفحوصات للنساء اللواتي لديهن تاريخ من تغيرات عنق الرحم السابقة للسرطان

الوقاية باللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري:

يحمي لقاح فيروس الورم الحليمي البشري من انواع الفيروس العالية الخطورة التي غالباً ما تسبب سرطان عنق الرحم



- يوصى باللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 26 سنة.
- يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من عمر 9 سنوات و يؤخذ في الاعتبار حتى عمر 45 سنة.

